

HOMOLOGATION FONGICIDES
MILDIOU DE LA POMME DE TERRE
(Phytophthora infestans (Mont.) de By)

Circonscriptions

- BASSE ET HAUTE-NORMANDIE
- BRETAGNE
- CHAMPAGNE-ARDENNE

Rapporteur

- Circonscription CHAMPAGNE-ARDENNE
(R. JOUANNEAU)

Ce document ne peut être communiqué qu'après la réunion de bilan, moyennant les corrections apportées et après accord de l'Administration Centrale.

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

S.P.V. 1982

Rapporteur : R. JOUANNEAU
Circonscription CHAMPAGNE-ARDENNE

HOMOLOGATION FONGICIDES MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

1. OBJET. Comparer 3 spécialités à la référence DITHANE M 45, en vue de donner un avis quant à leur homologation.

2. PROGRAMME - IMPLANTATION DES ESSAIS.

N°	SPECIALITE	Firme	Dose/hl	Préconisations
1	BRESTAN 10	Schering	0,2 kg	Cadence
2	ACYLON P	Ciba-Geigy	0,2 kg	Avertissements
3	AVISO G	B.A.S.F.	0,2 kg	Agricoles
4	DITHANE M 45	Quino	0,2 kg	


4 essais
- 1 en Normandie
- 1 en Bretagne
- 2 en Champagne

3. EVOLUTION DE LA MALADIE.


- Normandie : apparition fin juillet, témoin détruit à 95 % le 10.8
- Bretagne : apparition fin juin , témoin détruit à 95 % le 4.8
- Marne : mildiou absent (sècheresse)

4. PRINCIPAUX RESULTATS : MOYENNE 2 ESSAIS : Normandie - Bretagne

% destruction du feuillage
1ère quinzaine d'Août



indice rendement tubercules sains
(témoin = 100)



5. CONCLUSIONS.

ACYLON P confirme son excellente efficacité à la cadence de 14 jours, sur race de mildiou sensible au métalaxyl.

A la cadence de 10-11 jours, en conditions pluvieuses, BRESTAN 10 se comporte un peu mieux que DITHANE M 45, alors qu'AVISO G révèle une insuffisance sur feuillage.

I OBJET

4 essais "Mildiou de la Pomme de terre" ont été réalisés en 1982 par le Service de la Protection des Végétaux, afin de donner un avis relatif à l'homologation des 3 spécialités : BRESTAN 10 - ACYLON P - AVISO G, comparées à la référence DITHANE M45.

II PROGRAMME D'EXPERIMENTATION

N°	Matières actives	Dosage g/hl	SPECIALITE Firme Teneurs % Dosage/hl	PRECONISATIONS
1*	fentinacétate + manèbe	18 + 125	BRESTAN 10 (2) (Schering) 9 + 62,5 0,2 kg	Cadence Avertissements agricoles
2*	métalaxyl + manèbe	22,5 + 117,5	ACYLON P (2) (Ciba-Geigy) 11,25 + 58,75 0,2 kg	
3	cynexanil + métirame de zinc	9,6 + 128	AVISO G (1) (B.A.S.F.) 4,8 + 64 0,2 kg	
4*	mancozèbe	160	DITHANE M 45 (La Quinoleine) 80 0,2 kg	<u>Référence</u>

* spécialités homologuées ou en autorisation provisoire de vente. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'années d'expérimentation au Service de la Protection des Végétaux.

Les spécialités suivantes ont été ajoutées au programme

N°	Matières actives	Dosage g/hl	SPECIALITE Firme teneurs dosage/hl	Circonscription
5*	chlorathalonil	150	DACONIL 500 FLOWABLE (Diamond) 500 g/l 0,3 l	Basse et Haute Normandie
6*	manèbe	160	REMASAN (Pepro) 80 0,2 kg	Champagne

III IMPLANTATION DES ESSAIS

4 essais ont été mis en place dans 3 circonscriptions :

- CIRCONSCRIPTION BASSE ET HANTE-NORMANDIE
1 essai à l'Institut horticole St-Gabriel
à BRECY (Calvados) n° 14-1
Expérimentateurs : MM NOUVEL, GUINEFOLEAU, MORIN
- CIRCONSCRIPTION BRETAGNE
1 essai au Domaine I.N.R.A.
à LE RHEU (Ille et Vilaine) n° 35-1
Expérimentateur : M L'HOSTIS
- CIRCONSCRIPTION CHAMPAGNE-ARDENNE
1 essai sur le terrain du Service de la Protection des Végétaux
à ST THIERRY (Marne) n° 51-1
1 essai chez MM ROULOT Henry et Guy
à HAUSSIMONT (Marne) n° 51-2
Expérimentateurs MM JOUANNEAU, LEFORT, SOUDE

Ces essais ont été réalisés sur la variété BINTJE à l'exception du dernier (variété féculière KAPTAH-VANDEL).

Le Mildiou ne s'est pas manifesté dans les essais de la Marne.

IV CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS

- 1° Renseignements cultureux : voir Annexe I
- 2° Conditions climatiques, développement du Mildiou, avertissements agricoles.

a) conditions générales : voir Annexe II

Un mois de janvier contrasté entre le Nord Est (froid) et l'Ouest succède à un automne pluvieux. Les précipitations de Mars, suivi d'un mois d'Avril sec et frais retardent la plantation et la levée, dans des sols bien pourvus en réserves d'eau.

L'été se caractérise par des températures généralement excédentaires, et des orages nombreux mais répartis irrégulièrement. La pluviométrie est copieuse en mai-juin à Reims, en juin-juillet dans l'Ouest où elle permet le développement du mildiou. Par contre dans le Sud de la Marne, les déficits de juillet et août portent préjudice aux rendements des cultures féculières.

Septembre, chaud, facilite les récoltes.

Le total du 1er mai au 31 août représente :

- un excédent de 124 mm à CAEN, 33 mm à RENNES, 3 mm à REIMS (51-1)
- un déficit de 67 mm à SONTMESOUS (51-2)

b) conditions particulières présidant au développement de la plante hôte et du parasite : voir Annexe III

Les plantations sont groupées du 15 avril (51-2) au 28 avril (35-1) dans l'ordre inverse des précocités climatiques (en mars et en avril il fait 3° de plus à Rennes qu'à Reims, cet écart s'atténuant en mai et juin).

Les levées de Bintje se produisent autour de la mi-mai alors que les températures viennent de se relever sensiblement et que déjà les premières taches de Mildiou sont signalées localement sur les cultures de primeurs de la Côte Bretonne. KAPTAH lève le 25 mai à HAUSSIMONT.

1. The first part of the report...

2. The second part of the report...

3. The third part of the report...

4. The fourth part of the report...

5. The fifth part of the report...

6. The sixth part of the report...

7. The seventh part of the report...

8. The eighth part of the report...

9. The ninth part of the report...

10. The tenth part of the report...

11. The eleventh part of the report...

12. The twelfth part of the report...

13. The thirteenth part of the report...

14. The fourteenth part of the report...

15. The fifteenth part of the report...

16. The sixteenth part of the report...

17. The seventeenth part of the report...

18. The eighteenth part of the report...

19. The nineteenth part of the report...

20. The twentieth part of the report...

21. The twenty-first part of the report...

22. The twenty-second part of the report...

C'est un flux chaud et instable de Sud et Sud-Ouest qui dominera pratiquement les conditions climatiques du développement actif de la pomme de terre, donnant des orages nombreux mais aléatoires séparés par des périodes relativement ensoleillées, ce qui explique que les attaques de mildiou aient été absentes ou moins virulentes qu'en 1981 (les agriculteurs, sensibilisés par les dégâts ont probablement été plus vigilants, ce qui est une deuxième explication).

Exemples :

- autour du 14 juillet 93 mm à CAEN, 3 mm à REIMS.
- autour du 21 juillet 34 mm à REIMS, 8 mm à CAEN.
- autour du 30 juillet 40 mm à RENNES, 10 mm à CAEN et REIMS.

Les épisodes anticycloniques ont toujours été brefs ; par contre le régime perturbé d'Ouest, frais, prend à plusieurs reprises le relai des orages (13 à 20 jours de précipitations par mois, dans deux cas sur trois), laissant peu de répit aux avertisseurs et aux producteurs. Les avertissements se succéderont de la mi-mai à la mi-août, selon les situations et les types de cultures.

Dès le 3 juin, les expérimentateurs de Rennes réussissent une contamination artificielle sur rangs de bordure, qui aboutit aux premières taches dans leurs parcelles témoins le 25 juin. A peu près à la même date, les premiers foyers sont signalés par les Stations d'Avvertissements agricoles, un peu partout en Bretagne ainsi qu'à proximité des essais de Normandie et de Sud-Marne. Dans la Marne, le début de la floraison est signalé le 23 juin sur BINTJE, le 30 juin sur KAPTAH.

c) Evolution des maladies dans les témoins.

- Le mildiou a évolué totalement dans les 2 essais de l'Ouest, aboutissant à une destruction à 95 % le 5 août en Bretagne, quelques jours plus tard en Normandie. La phase finale de l'évolution s'est toutefois située plus tardivement qu'en 1981 en Normandie, en rapport probablement avec la sécheresse observée du 27 juin au 11 juillet, les orages dits "du 14 juillet" facilitant la relance.
- Aucune trace de mildiou n'a été décelée par contre dans les 2 essais de la Marne ; quelques taches brunes suspectes n'ont jamais pu fructifier, même en chambre humide. Il n'est tombé en effet que 39 mm de pluie à Reims du 11 juin au 20 juillet, 32 mm à Haussimont. Cette sécheresse par contre a augmenté l'effet de dessèchement des tiges du à la dartrose et à la verticilliose, effet observé dès le 19 juillet sur BINTJE, un mois plus tard sur KAPTAH. Ce dernier essai a d'ailleurs été défané le 3/9 et récolté dès le 7/9, en raison d'un arrosage incontrôlé qui risquait de fausser les rendements.

3° Applications réalisées dans les essais

Précédent les premières taches, les traitements commencent à la mi-juin dans l'Ouest. Dans la Marne, la situation restant très saine, les premières applications se font le 22 sur KAPTAH, le 30 seulement sur BINTJE. Les programmes de protection prendront fin vers la fin de mois de juillet, à l'exception de l'essai sur KAPTAH (23 août).

4 à 6 applications de métalaxyl + manèbe ont été réalisées dans les essais, à des intervalles variant de 11 à 18 jours.

4 à 7 applications de produits de contact, ou pénétrants, se sont succédées à des intervalles de 7 à 18 jours.

Au total, ce sont des périodes de 7 à 10 semaines de végétation qui ont été couvertes par la protection antimildiou.

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

V RESULTATS.

1° En matière d'efficacité contre le Mildiou (Voir Annexe V)

a) Notations précoces sur feuillage.

Le nombre de taches sur 100 pieds a été suivi chaque semaine, dans l'essai de Rennes, dès l'apparition des taches. Au bout de la 2ème, de la 3ème et de la 5ème semaine, des écarts hautement significatifs apparaissent. 2 groupes se distinguent :

- ACYLON P supérieur aux autres spécialités
- puis ACYLON P > BRESTAN 10 > AVISO G et DITHANE

A la fin de cette première période de notation, avec 1 tache pour 5 pieds soit 97 % d'efficacité relative par rapport à la référence, ACYLON P assure une protection parfaite, BRESTAN 10 une bonne efficacité de l'ordre de 50 %, alors qu'AVISO Gest constamment inférieur à DITHANE M 45, bien que ce dernier écart ne soit pas significatif.

La régression du nombre de taches notée pour les produits "de contact" entre le 9 et le 16 juillet peut s'expliquer par le coup de chaleur qui a flétri totalement un certain nombre de folioles fortement touchés par la maladie.

b) Notations tardives.

- Essai de Normandie. L'évolution du mildiou est très rapide à partir de son apparition constatée le 25 juillet.
Au 5 août, l'ensemble des spécialités assure une efficacité fongicide supérieure ou égale à 95 % (par rapport au témoin dont le feuillage est détruit à 70 %).
Au 12 août, cette efficacité est encore de 70 à 85 %. ACYLON, DACONIL et DITHANE sont en tête, AVISO en queue mais ces différences ne sont pas significatives.

- Essai de Bretagne.

Le 23 juillet, la surface de feuillage détruite est estimée :

- directement dans le témoin (52 %)
- à partir du nombre de taches, selon les normes de la Commission des Essais Biologiques, pour les produits.
L'expérimentateur a estimé qu'il n'y avait pas de différence appréciable en matière de surface correspondant à 1 tache, d'une spécialité à l'autre. Par ailleurs, seules les taches des parcelles traitées à l'ACYLON P ne fructifiaient pas.

Le 4 août, les notations, toutes visuelles, font apparaître 4 niveaux de signification :

- ACYLON P en tête avec 98 % d'efficacité
- puis BRESTAN et DITHANE (80-85 %)
- AVISO (60 %)
- enfin le témoin détruit à 95 %

2° Essais de la Marne : notations secondaires (tardives)

En absence totale de mildiou, aucune différence significative n'a été mise en évidence, qu'il s'agisse :

- du % de surface foliaire détruite par les effets conjoints de la sécheresse, de la dartrose et de la verticilliose sur BINTJE (essai 51-1, le 12 août).
- du nombre de tiges desséchées sur KAPTAH (essai 51-2, le 23 août).
- de la note de vigueur estimée d'après "l'ombre au sol à midi" pour les deux essais précédents, les 23 et 26 août.

.../...

3° Sélectivité.

Aucun signe de phytotoxicité lié à l'application de telle ou telle spécialité n'a été relevé par les expérimentateurs.

En absence totale de mildiou, on ne note aucune corrélation entre les notations secondaires ci-dessus évoquées et les rendements en tubercules, dont les écarts sont faibles et non significatifs.

On peut donc présumer qu'aucune des spécialités n'a d'effet prouvé de phytotoxicité ou de "stimulation" de la végétation.

4° Effets sur les rendements en tubercules (Annexe VI, 1°).

Que l'on considère le rendement total, la récolte saine, ou la récolte saine et commercialisable modifie très peu le classement relatif des spécialités.

- Essai de Normandie. Une forte hétérogénéité enlève malheureusement la signification à des écarts notables de rendements, ceux de BRESTAN et d'AVISO pouvant paraître "surfaits".
- Essai de Bretagne. Très précis, au contraire, cet essai reconstitue à la pesée, les 3 groupes de signification qui étaient apparus, 3 et 5 semaines après l'apparition de la maladie, au comptage des taches de mildiou.
 - ACYLON P, en tête, double le rendement.
 - BRESTAN 10
 - enfin DITHANE M 45 et AVISO G.
- Essai de la Marne. Non significatifs. La cartographie des essais a montré que dans les deux cas, un effet "terrain" avait favorisé le manèbe et défavorisé AVISO.
- Le regroupement des 4 essais (regroupement dont la signification est douteuse), place BRESTAN et ACYLON à 12 % au dessus d'AVISO et DITHANE.

5° Effets sur la qualité de la récolte (Annexe VI, 2° à 4°).

- Teneur en fécule (51-2) : 19,8 à 20,8 % selon les conditions (1 échantillon moyen par condition).
- Pourcentage de petits tubercules (35-1 et 51-1). Les écarts faibles n'ont pas été analysés (2 % entre le meilleur et le moins bon produit).
- Pourcentage de tubercules mildiousés.
 - ACYLON P se révèle pratiquement parfait dans les 2 essais.
 - Dans l'essai de Normandie, les autres produits en particulier AVISO sont meilleurs que le témoin mais non significativement.
 - En Bretagne, au contraire, ce même groupe se révèle aussi médiocre que le témoin, si l'on tient compte du premier mois de conservation.

.../...

VI DISCUSSION - CONCLUSION :

1° Essai de Normandie (14-1)

L'ensemble des spécialités est apporté simultanément à des cadences longues. Le 3ème apport survient le 16 juillet, 18 jours après le traitement précédent, mais surtout à l'issue d'une séquence de quatre jours doux et extrêmement pluvieux, totalisant 91 mm, très probablement contaminateurs puisque les premières taches seront observées le 25. Les destructions de 14 % à 32 % du feuillage, selon les spécialités, sont normales pour les produits de contact. On peut supposer que l'action curative du métalaxyl lui-même était atténuée au bout de 18 jours. La dernière application du 2 août (après deux séquences de pluie de 20 mm, isolées il est vrai et séparées par une période sèche et fraîche) ne pouvait redresser la situation.

2° Essai de Bretagne (35-1)

La première application généralisée intervient opportunément le 11/6 avant la première pluie contaminatrice du 13.

La cadence très régulière de la spécialité à base de métalaxyl (14 jours) assurera en 4 passages une protection très satisfaisante du feuillage et des tubercules, en dépit de plusieurs périodes très pluvieuses.

Les toutes premières taches se manifestent dès le 25 juin sur les parcelles traitées avec les produits de contact, plus ou moins lessivés par les 26 mm de pluie tombés avant la 2ème application du 21, mais surtout par les pluies encore plus abondantes qui suivront celles-ci (44 mm).

Les cadences des produits de contact : 9 à 11 jours en général, sont meilleures qu'en Normandie, mais en absence de renouvellement elles n'empêchent pas une évolution du mildiou notable pour Brestan et Dithane, inacceptable pour AVISO. 7 applications au total auraient été nécessaires pour bien couvrir cette période très pluvieuse de la mi-juin à fin juillet avec des spécialités de contact.

3° Conclusion par produit.

ACYLON P confirme sa sécurité d'emploi à la cadence de 14 jours en période difficile sur race sensible de mildiou.

BRESTAN 10, à la cadence de 10 jours, se comporte un peu mieux que la référence dans les conditions pluvieuses.

AVISO G est parfois efficace vis à vis du mildiou du tubercule. L'effet pénétrant du cymoxanil ne s'est pas extériorisé dans les conditions des 2 essais atteints par le mildiou en 1982. La persistance d'action sur feuillage, ou la tenue au lessivage, ou ces deux facteurs ont été mis en défaut nettement.

Le rapporteur fait cependant observer que la pratique expérimental de traitement à basse pression (3-4 bar) et sans pendentifs défavorise les produits de contact par rapport aux systémiques.

Essais S.P.V. 1982 - Homologation fongicides - Mildiou de la pomme de terre.

ANNEXE I - RENSEIGNEMENTS CULTURAUX

Essai n°	Région agricole Type de sol Préparation Entretien du sol Désherbage	Avant-précédent Précédent Fumure	Ecartements Densité/ha	VARIETE Classe Calibra- ge	Dispositif Surface (m2/parcelle) traitée-ré- coltée	Dates (intervalles en jours)		
						planta- tion (P)	défanage (D)	récolte
14-1	Plaine de Caen Labour fin mars Cultivateur - herse Buttage 13/5 SENCORAL 16/5	1981 Blé fumier 30 T 80 - 200 - 300	0,75 x 0,33 40.000	BINTJE A	B 4 24 - 13,5	21/4	17/8 REGLONE2 P + 118	28/9 D + 42
35-1	Bassin de Rennes Limono-argileux Labour printemps Cultivateur X 3 Buttage 4/6 SENCORAL 6/5	1980 - maïs 1981 - blé 80 - 130 - 130	0,65 x 0,40 38.000	BINTJE préger- mée A	B 4 10,4-10,4	28/4	-	9/9 P + 134
51-1	Tardenois Arg.-calc. lourd Labour printemps Fraise SENCORAL 10/5	1980 - Pomme de T. 1981 - Légumes div. 135 - 200 - 270	0,65 x 0,40 38.000	BINTJE A 28/35mm	B 6 10,4-10,4	20/4	-	8/9 P + 141
51-2	Champagne crayeuse Crayeux Labour décembre Canadien, fraise, herse croskill x 2 Buttage SENCORAL	1980 - blé 1981 - betteraves 160 - 180 - 180 + MgO : 70	0,75 x 0,33 40.000	KAPTAH VANDEL	B 4 15 - 6,75	15/4	3/9manuel P + 141	7/9 D + 4

Essais S.P.V. 1982 - Homologation fongicides - Mildiou de la pomme de terre.

ANNEXE II - DONNEES METEOROLOGIQUES GENERALES

CAMPAGNE DU 1.10.81 au 30.09.82

STATION	Données	OCT.81	NOV.	DEC.	JANV.82	FEV.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOUT	SEPT.	TOTAL 12 mois
CAEN M.N. 15 Km SE de Brecy (14)	ΔP jP jB H ΔT ΔI	+ 72	- 45	+ 67	- 17	- 28	+ 24	- 23	+ 1 14 4 65 %	+ 58 20 3 69 %	+ 65 11 3 74 %	0 19 3 64 %	- 25	+ 174
RENNES M.N. 7 Km E de LE RHEU (35)	ΔP jP jB H ΔT ΔI	+ 34	- 52	+ 46	+ 10	- 10	+ 10	- 39	- 11 13 2 52 %	+ 24 17 3 55 %	+ 52 13 2 51 %	- 32 13 6 60 %	- 26	+ 6
REIMS M.N. 5 Km E de ST THIERRY(51)	ΔP jP jB H ΔT ΔI	+ 70	- 13	+ 31	+ 19	- 30	+ 44	- 27	+ 29 14 4 58 %	+ 21 20 5 59 %	- 1 6 2 54 %	- 46 10 4 62 %	+ 12	+ 109
SOMMESOUS 3 Km NE de HAUSSIMONT (51)	ΔP jP jB	+ 83	- 26	+ 33	+ 18	- 39	+ 57	- 40	- 1 15 7	- 1 17 2	- 26 5 0	- 39 10 5	+ 18	+ 37

ΔP = écart des précipitations par rapport à la normale (en mm)

jP = nombre de jours de pluie


jB = nombre de jours de brouillard

H = hygrométrie moyenne à 15 heures

ΔT = écart de la température moyenne à la moyenne
(arrondi au °C le plus proche)

ΔI = écart de l'insolation à la moyenne (h/mois)

SPV 1982. Homologation MIL DIOU de la POMME DE TERRE - ANNEXE III. CONDITIONS CLIMATIQUES - CYCLES -
 (GUNTZ-DIVOUX)
 * 1m baches/essex



ESSAIS SPV 1982 - ANNEXE IV : AVERTISSEMENTS-APPLICATIONS SUR ESSAIS

Mildiou de la pomme de terre

A : apparition des taches dans l'essai - D 50, D 95 : destruction à 50, 75 % - Df : défanage
(14) : intervalles entre application en jours. - R : récolte

Nombre - d'avertissements - d'applications	31 Mai	10 Juin	20 Juin	30 Juin	10 Juillet	20 Juillet	31 Juillet	10 Août	20 Août	31 Août	10 Septembre	20 Septembre	31 Septembre	Appareil Volume/ha-Pression
<u>ESSAI 14-1</u>							A 1e	D 90 1e 10	Df 1e 17				R 1e 28	
8 avertissements		11	15	22	1	15	25	2-4						
4 métalaxyl			15 (14)	29	(17)	16	(17)	2						VAN DER WEIJ
4 contact			15 (14)	29	(17)	16	(17)	2						800 L
<u>ESSAI 35-1</u>				A 1e			D 50	D 95					R	
5 avertissements	13-27			25			1e 22	1e 4					1e 9	
4 métalaxyl		11	(14)	25	(14)	9	(14)	23						PULPREX
5 contact		11(10)	21(11)	2	(14)	16	(7)	23						1000 L - 3,2 bar
<u>ESSAI 51-1</u>					Mildiou absent								R	
8 avertissements	27	4	10	17	24	1	8	22					1e 9	
4 métalaxyl					30	(12)	12	(14)	26	(11)	6			PULPREX
4 contact					30	(12)	12	(11)	23(11)	3				1000 L - 4 bar
<u>ESSAI 51-2</u>					Mildiou absent								Df	
10 avertissements	27	4	10	17	24	1	8	22	29	5			1e 3	R 1e 7
5 métalaxyl					22	(17)	9(12)	21	(14)	4	(16)	20		
7 contact					22(8)	30(9)	9(12)	21	(12)	2	(11)	13	(10)	23
														PULPREX
														1000 l - 4 bar

Les doses/ha ont été calculées sur la base de 1000 l de bouillie, à partir de la dose/hl.

ANNEXE V - NOTATIONS SUR FEUILLAGE.

1° Nombre de taches de mildiou sur 100 pieds (Essai 35-1)

Analyse statistique après transformation LOG X+1. Test de Newman et Keuls, au seuil de 5 % pour les groupes de signification : a, b...

— significativement meilleur que le témoin

==== " meilleur que la référence DITHANE M 45

= = = " inférieur à la référence

A + 14 signifie : 14 jours après apparition des premières taches sur témoins

Date	BRESTAN10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	SIGNIFICATION
17/6 = A Nb taches	0,6	2,5	3	1,2	1,2	
25/5 = A+8 Nb taches = indice	1,9 = 76	0 = 0	0,8 = 32	2,5 = 100	74,2	
2/7 = A+15 Nb taches = indice	16,7 = 88 a	1,2 = 6 a	7,7 = 41 a	19 = 100 a	2137 b	HS
9/7 = A+22 Nb taches = indice	42 = 56 b	1,7 = 2 a	381 = 507 b	75,2 = 100 b	-	HS
16/7 = A+29 Nb taches indice	11,2 = 59	9 = 47	156 = 821	19 = 100	-	NS
23/7 = A+36 Nb taches indice	346 = 43 b	21,2 = 3 a	1681 = 210 c	799 = 100 c	-	HS

2° Pourcentage de pieds attaqués par mildiou (Essai 14-1)

Dates	BRESTAN10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	DACONIL
5/8 S	92,5 a	76,2 ab	95 ab	70 ab	100	58,7 c
12/8	100	100	100	100	100	100

3° Pourcentage de folioles détruits par pied attaqué (Essai 14-1)

Dates	BRESTAN10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	DACONIL
5/8 : % indice TMS	2,37 = 5,9 b	1,75 = 4,4 b	3,75 = 9,4 b	1,37 = 3,4 b	40 = 100 a	1,37 = 3,4 c
12/8 : % (=indice) TMS	9,50 a	7,75 ab	23,75 = 59,4 b	8 = 20 b	100 c	8 a

ANNEXE V (SUITE)

4° Pourcentage de surface foliaire détruite :

- par le mildiou (essais 14-1 et 35-1)
- par la dartrose, la verticillose et la sécheresse (essai 51-1)

Analyse statistique après transformation Arc sinVx.

ESSAIS dates	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	DACONIL 500FL	SIGNIF
<u>N° 14-1</u> 5/8	<u>2,75</u> a	<u>1,75</u> a	<u>3,50</u> a	<u>1,75</u> a	70 b	<u>1,75</u> a	THS
12/8 * *	<u>20</u> a	<u>13,75</u> a	<u>32</u> a	<u>14,50</u> a	100 b	<u>13,75</u> a	THS
<u>N° 35-1</u> 2/7	-	-	-	-	2,1	-	-
9/7	-	-	-	-	15,4	-	-
16/7	-	-	-	-	27	-	-
23/7	0,34*	0,02*	1,68*	0,80*	52,5	-	-
4/8 * *	15,2 b	<u>1,3</u> a	<u>36,7</u> c	17 b	95 d	-	HS
=====							
MOY. 2 derniers comptages * *							
-	17,6	7,5	34,3	15,6	97,5	-	-
<u>N° 51-1</u>	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	REMASAN	
12/8	79,2	70,0	76,7	80,0	73,3	67,5	NS

* Estimation à partir du nombre de taches, selon CEB (10 taches = 1 % de la surface foliaire d'1 pied).

5° Essais Marne. Effets sur les touffes de la sécheresse, de la dartrose et de la verticillose à la date du 23/8/82.

	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	REMASAN	SIGNIF
Nombre de tiges desséchées sur 120 pieds							
<u>Essai 51-2</u>							
Le 23/8/82	5,2	2,5	4,5	1,2	0,5	2,0	NS
Note de vigueur (ombre au sol à midi) de 0 à 10							
<u>Essai 51-2</u>							
Le 23/8/82	7,9	7,8	8,1	7,8	7,2	7,8	NS
<u>Essai 51-1</u>							
Le 26/8/82	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	NS

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

NAME	ADDRESS
John A. Smith	123 Main St, New York, NY
James B. Jones	456 Elm St, Boston, MA
Robert C. Brown	789 Oak St, Chicago, IL
William D. White	101 Pine St, Philadelphia, PA
Thomas E. Black	202 Cedar St, San Francisco, CA
Charles F. Green	303 Maple St, Washington, DC
David G. Hall	404 Birch St, Los Angeles, CA
Edward H. King	505 Spruce St, Portland, ME
Frank I. Lee	606 Fir St, Seattle, WA
George J. Miller	707 Ash St, Denver, CO
Henry K. Davis	808 Hickory St, Minneapolis, MN
Isaac L. Wilson	909 Walnut St, St. Louis, MO
Joseph M. Taylor	1010 Chestnut St, Cincinnati, OH
Samuel N. Anderson	1111 Sycamore St, Indianapolis, IN
Benjamin O. Clark	1212 Dogwood St, Savannah, GA
Samuel P. Lewis	1313 Magnolia St, New Orleans, LA
John Q. Walker	1414 Redwood St, San Jose, CA
Robert R. Young	1515 Cypress St, Houston, TX
Thomas S. Allen	1616 Juniper St, Salt Lake City, UT
Charles T. Wright	1717 Willow St, Phoenix, AZ
David U. Scott	1818 Cottonwood St, Las Vegas, NV
Edward V. Adams	1919 Palm St, Miami, FL
Frank W. Baker	2020 Laurel St, Baltimore, MD
George X. Carter	2121 Birch St, Detroit, MI
Henry Y. Evans	2222 Spruce St, Milwaukee, WI
Isaac Z. Foster	2323 Fir St, Cleveland, OH
Joseph A. Green	2424 Ash St, Pittsburgh, PA
Samuel B. Hall	2525 Hickory St, Richmond, VA
Benjamin C. King	2626 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel D. Lee	2727 Magnolia St, Norfolk, VA
John E. Miller	2828 Redwood St, Norfolk, VA
Robert F. Taylor	2929 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas G. Walker	3030 Juniper St, Norfolk, VA
Charles H. Wright	3131 Willow St, Norfolk, VA
David I. Scott	3232 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward J. Adams	3333 Palm St, Norfolk, VA
Frank K. Baker	3434 Laurel St, Norfolk, VA
George L. Carter	3535 Birch St, Norfolk, VA
Henry M. Evans	3636 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac N. Foster	3737 Fir St, Norfolk, VA
Joseph O. Green	3838 Ash St, Norfolk, VA
Samuel P. Hall	3939 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin Q. King	4040 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel R. Lewis	4141 Magnolia St, Norfolk, VA
John S. Walker	4242 Redwood St, Norfolk, VA
Robert T. Young	4343 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas V. Allen	4444 Juniper St, Norfolk, VA
Charles W. Wright	4545 Willow St, Norfolk, VA
David X. Scott	4646 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward Y. Adams	4747 Palm St, Norfolk, VA
Frank Z. Baker	4848 Laurel St, Norfolk, VA
George A. Carter	4949 Birch St, Norfolk, VA
Henry B. Evans	5050 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac C. Foster	5151 Fir St, Norfolk, VA
Joseph D. Green	5252 Ash St, Norfolk, VA
Samuel E. Hall	5353 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin F. King	5454 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel G. Lewis	5555 Magnolia St, Norfolk, VA
John H. Miller	5656 Redwood St, Norfolk, VA
Robert I. Taylor	5757 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas J. Walker	5858 Juniper St, Norfolk, VA
Charles K. Wright	5959 Willow St, Norfolk, VA
David L. Scott	6060 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward M. Adams	6161 Palm St, Norfolk, VA
Frank N. Baker	6262 Laurel St, Norfolk, VA
George O. Carter	6363 Birch St, Norfolk, VA
Henry P. Evans	6464 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac Q. Foster	6565 Fir St, Norfolk, VA
Joseph R. Green	6666 Ash St, Norfolk, VA
Samuel S. Hall	6767 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin T. King	6868 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel U. Lewis	6969 Magnolia St, Norfolk, VA
John V. Walker	7070 Redwood St, Norfolk, VA
Robert W. Young	7171 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas X. Allen	7272 Juniper St, Norfolk, VA
Charles Y. Wright	7373 Willow St, Norfolk, VA
David Z. Scott	7474 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward A. Adams	7575 Palm St, Norfolk, VA
Frank B. Baker	7676 Laurel St, Norfolk, VA
George C. Carter	7777 Birch St, Norfolk, VA
Henry D. Evans	7878 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac E. Foster	7979 Fir St, Norfolk, VA
Joseph F. Green	8080 Ash St, Norfolk, VA
Samuel G. Hall	8181 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin H. King	8282 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel I. Lewis	8383 Magnolia St, Norfolk, VA
John J. Miller	8484 Redwood St, Norfolk, VA
Robert K. Taylor	8585 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas L. Walker	8686 Juniper St, Norfolk, VA
Charles M. Wright	8787 Willow St, Norfolk, VA
David N. Scott	8888 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward O. Adams	8989 Palm St, Norfolk, VA
Frank P. Baker	9090 Laurel St, Norfolk, VA
George Q. Carter	9191 Birch St, Norfolk, VA
Henry R. Evans	9292 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac S. Foster	9393 Fir St, Norfolk, VA
Joseph T. Green	9494 Ash St, Norfolk, VA
Samuel U. Hall	9595 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin V. King	9696 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel W. Lewis	9797 Magnolia St, Norfolk, VA
John X. Walker	9898 Redwood St, Norfolk, VA
Robert Y. Young	9999 Cypress St, Norfolk, VA

NAME	ADDRESS
John A. Smith	123 Main St, New York, NY
James B. Jones	456 Elm St, Boston, MA
Robert C. Brown	789 Oak St, Chicago, IL
William D. White	101 Pine St, Philadelphia, PA
Thomas E. Black	202 Cedar St, San Francisco, CA
Charles F. Green	303 Maple St, Washington, DC
David G. Hall	404 Birch St, Los Angeles, CA
Edward H. King	505 Spruce St, Portland, ME
Frank I. Lee	606 Fir St, Seattle, WA
George J. Miller	707 Ash St, Denver, CO
Henry K. Davis	808 Hickory St, Minneapolis, MN
Isaac L. Wilson	909 Walnut St, St. Louis, MO
Joseph M. Taylor	1010 Chestnut St, Cincinnati, OH
Samuel N. Anderson	1111 Sycamore St, Indianapolis, IN
Benjamin O. Clark	1212 Dogwood St, Savannah, GA
Samuel P. Lewis	1313 Magnolia St, New Orleans, LA
John Q. Walker	1414 Redwood St, San Jose, CA
Robert R. Young	1515 Cypress St, Houston, TX
Thomas S. Allen	1616 Juniper St, Salt Lake City, UT
Charles T. Wright	1717 Willow St, Phoenix, AZ
David U. Scott	1818 Cottonwood St, Las Vegas, NV
Edward V. Adams	1919 Palm St, Miami, FL
Frank W. Baker	2020 Laurel St, Baltimore, MD
George X. Carter	2121 Birch St, Detroit, MI
Henry Y. Evans	2222 Spruce St, Milwaukee, WI
Isaac Z. Foster	2323 Fir St, Cleveland, OH
Joseph A. Green	2424 Ash St, Pittsburgh, PA
Samuel B. Hall	2525 Hickory St, Richmond, VA
Benjamin C. King	2626 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel D. Lee	2727 Magnolia St, Norfolk, VA
John E. Miller	2828 Redwood St, Norfolk, VA
Robert F. Taylor	2929 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas G. Walker	3030 Juniper St, Norfolk, VA
Charles H. Wright	3131 Willow St, Norfolk, VA
David I. Scott	3232 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward J. Adams	3333 Palm St, Norfolk, VA
Frank K. Baker	3434 Laurel St, Norfolk, VA
George L. Carter	3535 Birch St, Norfolk, VA
Henry M. Evans	3636 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac N. Foster	3737 Fir St, Norfolk, VA
Joseph O. Green	3838 Ash St, Norfolk, VA
Samuel P. Hall	3939 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin Q. King	4040 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel R. Lewis	4141 Magnolia St, Norfolk, VA
John S. Walker	4242 Redwood St, Norfolk, VA
Robert T. Young	4343 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas V. Allen	4444 Juniper St, Norfolk, VA
Charles W. Wright	4545 Willow St, Norfolk, VA
David X. Scott	4646 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward Y. Adams	4747 Palm St, Norfolk, VA
Frank Z. Baker	4848 Laurel St, Norfolk, VA
George A. Carter	4949 Birch St, Norfolk, VA
Henry B. Evans	5050 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac C. Foster	5151 Fir St, Norfolk, VA
Joseph D. Green	5252 Ash St, Norfolk, VA
Samuel E. Hall	5353 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin F. King	5454 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel G. Lewis	5555 Magnolia St, Norfolk, VA
John H. Miller	5656 Redwood St, Norfolk, VA
Robert I. Taylor	5757 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas J. Walker	5858 Juniper St, Norfolk, VA
Charles K. Wright	5959 Willow St, Norfolk, VA
David L. Scott	6060 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward M. Adams	6161 Palm St, Norfolk, VA
Frank N. Baker	6262 Laurel St, Norfolk, VA
George O. Carter	6363 Birch St, Norfolk, VA
Henry P. Evans	6464 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac Q. Foster	6565 Fir St, Norfolk, VA
Joseph R. Green	6666 Ash St, Norfolk, VA
Samuel S. Hall	6767 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin T. King	6868 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel U. Lewis	6969 Magnolia St, Norfolk, VA
John V. Walker	7070 Redwood St, Norfolk, VA
Robert W. Young	7171 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas X. Allen	7272 Juniper St, Norfolk, VA
Charles Y. Wright	7373 Willow St, Norfolk, VA
David Z. Scott	7474 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward A. Adams	7575 Palm St, Norfolk, VA
Frank B. Baker	7676 Laurel St, Norfolk, VA
George C. Carter	7777 Birch St, Norfolk, VA
Henry D. Evans	7878 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac E. Foster	7979 Fir St, Norfolk, VA
Joseph F. Green	8080 Ash St, Norfolk, VA
Samuel G. Hall	8181 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin H. King	8282 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel I. Lewis	8383 Magnolia St, Norfolk, VA
John J. Miller	8484 Redwood St, Norfolk, VA
Robert K. Taylor	8585 Cypress St, Norfolk, VA
Thomas L. Walker	8686 Juniper St, Norfolk, VA
Charles M. Wright	8787 Willow St, Norfolk, VA
David N. Scott	8888 Cottonwood St, Norfolk, VA
Edward O. Adams	8989 Palm St, Norfolk, VA
Frank P. Baker	9090 Laurel St, Norfolk, VA
George Q. Carter	9191 Birch St, Norfolk, VA
Henry R. Evans	9292 Spruce St, Norfolk, VA
Isaac S. Foster	9393 Fir St, Norfolk, VA
Joseph T. Green	9494 Ash St, Norfolk, VA
Samuel U. Hall	9595 Hickory St, Norfolk, VA
Benjamin V. King	9696 Dogwood St, Norfolk, VA
Samuel W. Lewis	9797 Magnolia St, Norfolk, VA
John X. Walker	9898 Redwood St, Norfolk, VA
Robert Y. Young	9999 Cypress St, Norfolk, VA

ANNEXE VI - NOTATIONS SUR TUBERCULES ET RENDEMENTS.

1° Rendements en tubercules (T/ha) - récolte saine : S
 - récolte saine et commercialisable : SC
 - récolte totale : T

ESSAI-date Rdt=indice Significat.	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M45	Témoin	DACONIL FL 500	REMASAN
<u>14-1</u> 28/9 S*	22,4 =127	19,6 =111	18,9 =107	17,6 =100	14,0 = 80	20,4 =116	-
NS							
T**	22,5 =127	19,6 =111	18,9 =107	17,7 =100	14,2 = 80	20,5 =116	-
<u>35-1</u> 9/9 S* (1)	<u>57,8</u> =114	<u>65,0</u> =129	<u>47,3</u> = 94	<u>50,5</u> =100	31,7 = 62	-	-
HS	b	a	c	c	d	-	-
SC	<u>50,8</u> =114	<u>55,9</u> =125	<u>41,8</u> = 94	<u>44,6</u> =100	27,7 = 62	-	-
T**(2)	b 59,5 =113	a 65,2 =124	c 49,7 = 94	c 52,6 =100	d 32,1 = 61	-	-
(1) un mois après la récolte - (2) tubercules pourris au moment de la récolte, non compris.							
<u>51-1</u> 9/9 S=T**	30,9 =103	31,8 =106	29,3 = 98	30,0 =100	31,9 =106	-	31,5 =105
NS	3,3	3,4	2,9	2,9	3,2	-	3,6
SC	27,6 =102	28,4 =105	26,4 = 97	27,1 =100	28,7 =106	-	27,9 =103
<u>51-2</u> 7/9 S=T**	29,9 =106	27,9 = 99	26,6 = 94	28,2 =100	26,9 = 95	-	30,5 =108
NS							
Regroupements des indices							
S*moy. 2 essais	=120,5	=120	=100,5	=100	71	-	-
T**Moy. 4 es- sais	=112,5	=110	= 98	=100	= 85,5	-	-

ANNEXE VI (SUITE)

2° Pourcentage de grenaille = $\frac{\text{Poids tubercules sains, calibre } < 35\text{mm}}{\text{Poids tubercules sains}} \times 100$

ESSAI	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	DACONIL FL 500	REMASAN
<u>35-1</u> %	12,1	14,0	11,6	11,6	12,6	-	-
<u>51-1</u> %	10,6	10,6	9,9	9,7	10,0	-	11,4

3° Pourcentage de tubercules mildiousés = $\frac{\text{Poids tubercules mildiousés}}{\text{Poids total récolté}} \times 100$

ESSAI	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	DACONIL FL 500
<u>14-1</u>	0,37	0	0,15	0,32	1,19	0,72
<u>35-1</u> (1)	3,9	0	4,7	4,3	6,7	-
(2)	<u>2,9</u>	<u>0,3</u>	<u>4,8</u>	<u>4,0</u>	<u>1,7</u>	-
(1)+(2)	6,8	0,3	9,5	8,3	8,4	-

(1) à la récolte, calculé sur la base de 150 g par tubercule atteint -
Mais = "il est difficile d'attribuer ces pourritures au mildiou
seul" (note de l'expérimentateur de Rennes).

(2) pendant le mois suivant la récolte.

4° Nombre de tubercules mildiousés à la récolte, et par 100 pieds
Analyse statistique après transformation en LOG X + 1

ESSAI	BRESTAN 10	ACYLON P	AVISO G	DITHANE M 45	Témoin	DACONIL FL 500
<u>14-1</u>						
S	3,1 ab	0 a	0,9 ab	2,7 ab	6,3 b	1,3 ab
<u>35-1</u>	40,5	0	41,1	39,8	37,9 (1)	-

(1) soit 1,6 % du nombre total des tubercules.

